Supplementary S2
First list

1. Consumo cocaína en ambientes seguros p.ej. en mi casa o en casa de mis amigos, en lugares destinados al consumo o en lugares tolerantes al consumo, acompañado de personas de confianza.
2. Me hidrato con suficiente agua
3. Consumo inicialmente una dosis baja de cocaína y en función de los efectos decido si quiero consumir más
4. Establezco una cantidad de cocaína límite para consumir en una sesión de consumo* y no la sobrepaso
5. La presión de los demas me hace consumir más cocaína de la que quiero
6. Consumo varías dosis en una sesión de consumo*
7. Reconozco los signos y sintomas de una sobredosis de cocaína
8. Sé como actuar frente a una sobredosis
9. Uso cocaína en compañía de personas que sabrían que hacer en caso de sobredosis
10. Prefiero vías de administración de menor riesgo, por ejemplo esnifada*
11. Evito el consumo de cocaína si tengo HIV
12. Evito el consumo de cocaína si me encuentro tomando medicamentos para el tratamiento de VIH
13. Evito el consumo de cocaína si tengo deficiencia de pseudocolinesterasa plasmática
14. Consumo cocaína solo si me estado físico es optimo
15. Consumo cocaína solo si mi estado de ánimo es optimo
16. Busco asesoría profesional si se percibo efectos adversos como tristeza profunda y constante, pérdida de interés por la vida, pensamientos suicidas
17. Consumo cocaína en ambientes seguros y libres de violencia, p.ej. en mi casa o en casa de mis amigos, en lugares destinados al consumo o en lugares tolerantes al consumo, acompañadx de personas de confianza.
18. He realizado actividades como conducir un vehiculo u operar una máquina, bajo los efectos de la cocaína
19. Me niego a subir en un vehículo que conduce alguien que ha estado usando drogas
20. Consumo habitualmente cocaína, con menos de tres semanas de diferencia entre una sesión de consumo* y la otra
21. Consumo cocaína solo si me estado físico es optimo
22. Evito el consumo de cocaína si tengo enfermedades cardiovasculares, renales, gastrointestinales, neuronales.
23. Detengo el consumo de cocaína si percibo efectos adversos en la salud física p.ej palpitaciones/arritmia, taquicardia, dolor y/o presión en el pecho, hipertensión, dolores de cabeza/ migraña, convulsiones, infecciones en la piel, sangrado nasal o daño en la mucosas nasales, soplo cardiaco, dificultad para respirar con cualquier actividad, etc.
24. Busco asesoría profesional si percibo efectos adversos en mi salud física p.ej palpitaciones/arritmia, taquicardia, dolor y/o presión en el pecho, hipertensión, dolores de cabeza/ migraña, convulsiones, infecciones en la piel, sangrado nasal o daño en la mucosas nasales, soplo cardiaco, dificultad para respirar con cualquier actividad, etc.
25. Consumo cocaína para realizar actividad física intensa
26. Evito el uso de cocaína durante el embarazo y la lactancia
27. Mezclo cocaína con otras sustancias
28. Prefiero las mezclas que sé que tiene un menor riesgo para mi salud
29. Conozco el contenido de la sustancia antes de consumirla / Hago uso de servicios de análisis de sustancias
30. Consumo inicialmente una dosis baja de cocaína (20-50mg) y en función de los efectos decido si quiero consumir más
31. Adquiero la sustancia de una fuente confiable p.ej. un vendedor al que frecuento o un amigo
32. Consumo cocaína aún cuando tengo conocimiento o sospecha de que está adulterada o sustituida
33. Hago uso de parafernalia* adecuada para el consumo de menor riesgo de cocaína como p.ej. pitillo/ popotes o tubos desechables o de vidrio
34. Comparto la parafernalia* con otras personas
35. Desinfecto con cloro la parafernalia* despues de cada sesión de consumo
36. Utilizo papeles, billetes, llaves, etc como instrumento para esnifar* cocaína
37. Utilizo preservativos y lubricantes durante las relaciones sexuales que tengo bajo los efectos de la cocaína
38. Prefiero vías de administración de menor riesgo, por ejemplo esnifada*
39. Prepararo adecuadamente la cocaína antes de consumirla, pulverizandola finamente
40. Alterno mis fosas al consumir cocaína
41. Limpio mis fosas nasales antes, durante y después el consumo
42. Humecto mis mucosas nasales con balsamo despues del cosnumo
43. Prefiero vías de administración de menor riesgo, por ejemplo esnifada*
44. He realizado actividades como conducir un vehiculo u operar una máquina, bajo los efectos de la cocaína
45. Consumo cocaína en ambientes seguros p.ej. en mi casa o en casa de mis amigos, en lugares destinados al consumo o en lugares tolerantes al consumo, acompañado de personas de confianza.
46. Consumo cocaína en compañia de personas en quien confío
47. No recibo cocaína de extraños

Supplementary S2 (continued)
48. Consumo cocaína en ambientes seguros y libres de violencia, p.ej. en mi casa o en casa de mis amigos, en lugares destinados al consumo o en lugares tolerantes al consumo, acompañadx de personas de confianza.
49. Realizo transacciones de sexo por cocaína o por dinero para comprarla
50. Me alimento bien y descanso después de consumir cocaína.
51. Consumo habitualmente cocaína, con menos de tres semanas de diferencia entre una sesión de consumo y la otra
52. Tengo periodos de desintoxicación o abstinencia entre mis consumos
53. No permito que el consumo se convierta en el eje central de mi vida/ El consumo de cocaína es una de las cosas más importantes de mi vida
54. Detengo el consumo de cocaína si percibo que aparecen signos y síntomas del trastorno por consumo de cocaína como preocupación sobre el consumo, imposibilidad de dejar de consumir, tolerancia, abstinencia, craving, etc.
55. Busco asesoría profesional si percibo que aparecen signos y síntomas del trastorno por consumo de cocaína como preocupación sobre el consumo, imposibilidad de dejar de consumir, tolerancia, abstinencia, craving, etc.
56. Evitar el uso de cocaína para contrarrestar los efectos secundarios del uso anterior (síndrome de abstinencia)
57. Evitar el uso de cocaína si se tiene antecedentes familiares de trastorno por uso de sustancias
58. Prefiero vías de administración de menor riesgo, por ejemplo esnifada
59. Consumo cocaína solo si mi estado de animo es optimo
60. Busco asesoría profesional si percibo que aparecen signos y síntomas de otros trastornos mentales derivados del uso de cocaína como delirios, alucinaciones, depresión, manía, ansiedad, obsesividad, dificultad para dormir, pérdida de la libido o deseo sexual , etc.
61. Evito el consumo de cocaína si se tengo antecedentes de psicosis, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, obsesividad, trastornos del sueño, trastornos sexuales o delirio.
62. Detengo el consumo de cocaína si percibo que aparecen signos y síntomas de otros trastornos derivados del uso de cocaína como delirios, alucinaciones, depresión, manía, ansiedad, obsesividad, dificultad para dormir, pérdida de la libido o deseo sexual , etc.
63. Evito el consumo de cocaína si tengo antecedente de otros trastornos mentales secundarios al uso de cocaína como trastornos de alimentación o trastorno por uso de otras sustancias.
64. Detener el consumo de cocaína si se evidencias signos y síntomas de otros trastornos mentales secundarios al uso de cocaína como trastornos de alimentación, disfunción sexual o trastorno por uso de otras sustancias.
65. Busco asesoría profesional si percibo que aparecen signos y síntomas de otros trastornos mentales secundarios al uso de cocaína como trastornos de alimentación, disfunción sexual o trastorno por uso de otras sustancias.
66. Evito el consumo de cocaína si me han diagnosticado algún trastorno por uso de otra sustancia psicoactiva
67. Consumo cocaína solo si mi estado de animo es optimo
68. El consumo de cocaína afecta mis finanzas personales
69. El consumo de cocaína me ha causado pérdidas materiales
70. He perdido mi trabajo por mi consumo de cocaína
71. He perdido mi hogar por mi consumo de cocaína
72. He abandonado mis estudios por mi consumo de cocaína
73. Busco asesoría profesional si mi consumo de cocaína me ocasiona pérdidas materiales, económicas, perdida del empleo, el hogar, deserción escolar.
74. Detengo el consumo de cocaína si mi consumo de cocaína me ocasiona pérdidas materiales, económicas, perdida del empleo, el hogar, deserción escolar.
75. El consumo de cocaína me ha hecho perder relaciones p.ej. de amistad o familiares
76. Busco asesoría profesional si mi consumo de cocaína me ocasiona pérdidas en relaciones personales p.ej. relaciones con la familia
77. Evito el uso de cocaína durante el embarazo y la lactancia
78. Continuo consumiendo cocaína aun cuando he percibido aumento de la agresividad, irritabilidad y violencia.
79. Me he involucrado en la comisión de delitos relacionados con la sustancia p.ej. fabricación, venta; o aquellos relacionados con conseguir la sustancia o dinero para comprarla p.ej. hurto
80. He cometido delitos violentos (lesiones personales, homicidio) mientras estoy bajo el efecto de la cocaína
81. He cometido otros delitos (vandalismo) mientras estoy bajo el efecto de la cocaína
82. El consumo de cocaína afecta mis relaciones familiares
83. He dejado de lado el cuidado de mis hijos por estar consumiendo cocaína o recuperandome del consumo
84. Detengo el consumo de cocaína si afecta mis relaciones familiares
85. Busco asesoría profesional si percibo afectación de mis relaciones familiares